



Diabète Occitanie s'est associée au **Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales (SELHV) de Toulouse** pour proposer aux patients diabétiques reçus dans le camion DIABSAT, un **dépistage des pathologies du foie**, d'origine métabolique ou hépatitique (en cas de facteurs de risque). DIABSAT enrichit ainsi le dépistage des complications chroniques du diabète : bilan rétinien, artériel, podologique et rénal, de la recherche d'une complication métabolique hépatique. La plus fréquente est la stéatose hépatique.

Les personnes vivant avec un diabète de type 2 sont particulièrement exposées aux maladies hépatiques stéatosiques associées à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) que ce soit des stéatoses (MAS) ou des stéatohépatites (MASH). Ces complications sont fréquentes, silencieuses et très souvent méconnues.

Une journée pilote intégrant cet examen complémentaire a eu lieu le mercredi 5 juin dernier à la Maison de santé du Mas d'Azil dans l'Ariège.

Ce dépistage complémentaire est très pertinent puisque **83% des patients présentaient une stéatose hépatique**. Ce retentissement hépatique du diabète est important à diagnostiquer car il constitue un argument supplémentaire pour sensibiliser les patients à mieux équilibrer leur diabète notamment par une meilleure hygiène de vie.

Une pérennisation de la pratique de ce dépistage de maladie du foie intégré dans le programme DIABSAT est à l'étude.

[View PDF](#)